

MOVIPREP®

COMMENT PRENDRE LE MÉDICAMENT

Chère patiente, cher patient,

Votre médecin vous a prescrit un lavage intestinal par **MOVIPREP®** en vue de votre prochain examen. Pour que cette préparation se déroule de manière optimale, veuillez suivre les recommandations ci-dessous.

Qu'est-ce que MOVIPREP® ?

MOVIPREP® est une poudre destinée à la préparation d'une solution de lavage intestinal. Que vous optiez pour le citron frais ou le goût fruité de l'orange : dissoute dans l'eau puis absorbée, la solution lave votre intestin.

L'effet recherché consiste aussi à produire des selles liquides. Le nettoyage intestinal efficace par **MOVIPREP®** offre à votre médecin une bonne visibilité, ce qui crée les conditions optimales d'une coloscopie réussie.

Régime à suivre pendant le lavage intestinal

Alimentation appropriée

- **À partir de 3 à 5 jours avant l'examen* :**

Il est déconseillé de consommer : des aliments contenant des graines (p. ex. kiwis, tomates, raisin, pain complet).

- **1 jour avant l'examen :**

Aliments recommandés : aliments pauvres en fibres (p. ex. pain blanc), thé, jus de fruits. Demandez à votre médecin si vous devez encore suivre d'autres règles avant de prendre **MOVIPREP®**.

- **Après la première gorgée de MOVIPREP® :**

Ne mangez plus d'aliments solides avant l'examen.

Buvez au moins un litre de liquide clair supplémentaire pendant cette période.

- **Les liquides clairs sont autorisés :**

Au plus tard deux heures avant l'examen, vous pouvez boire des boissons comme de l'eau, des soupes claires, des jus de fruits (sans pulpe), des limonades ou du thé clair (p. ex. camomille, sans lait).

* Veuillez suivre les instructions de votre médecin en ce qui concerne le début du régime (p. ex. 5 jours avant l'examen).

Les recommandations officielles¹ préconisent de commencer à suivre ce régime au plus tard 3 jours avant l'examen.

1. Walter B, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb; 19(2):331 – 338.

MOVIPREP®/MOVIPREP® Orange, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Zusammensetzung: Beutel A enthält: Macrogol 3350 100 g, Natriumsulfat 7,5 g, Natriumchlorid 2,691 g, Kaliumchlorid 1,015 g; Beutel B enthält: Ascorbinsäure 4,7 g, Natriumascorbat 5,9 g. **Sonstige Bestandteile MOVIPREP®:** Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Zitronenaroma (enthält Maltodextrin, Citral, Zitronenöl, Limonenöl, Xanthangummi, Vitamin E). **Sonstige Bestandteile MOVIPREP® Orange:** Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Orangenaroma (enthält natürliche Aromastoffe und -zubereitungen, Maltodextrin, D-Glucose). **Anwendungsgebiete:** Zur Darmreinigung vor klinischen Maßnahmen bei Erwachsenen, die einen sauberen Darm erfordern, z. B. endoskopische oder radiologische Untersuchungen des Darms. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand 03/2021


Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wettenberg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

Préparation de MOVIPREP®

IMPORTANT :

Entre la fin de la prise du deuxième litre et le début de l'examen, il faut compter au moins 2 heures pour obtenir un nettoyage complet de l'intestin.

Contenu de l'emballage MOVIPREP®



Une boîte de MOVIPREP® contient 2 sachets A et B.

Préparation de la 1ère dose de MOVIPREP®



Un litre de MOVIPREP® se compose d'un sachet A et d'un sachet B, qui sont dissous ensemble dans de l'eau pour former une solution de 1 litre.



Mélangez le tout jusqu'à ce que le liquide soit transparent (cela peut prendre quelques minutes).

Préparation de la 2e dose de MOVIPREP®



Un litre de MOVIPREP® se compose d'un sachet A et d'un sachet B, qui sont dissous ensemble dans de l'eau pour former une solution de 1 litre.



Mélangez le tout jusqu'à ce que le liquide soit transparent (cela peut prendre quelques minutes).

Prise de MOVIPREP®



heures

heures

- Suggestion : buvez MOVIPREP® bien frais, avec ou sans paille.
- Buvez 1 litre de MOVIPREP® dans un délai de 1 à 2 heures.
- Essayez de boire un verre toutes les 10 - 15 minutes.
- Nous recommandons vivement la consommation supplémentaire d'au moins un litre supplémentaire de liquide clair librement choisi pendant le même laps de temps.
- Au plus tard 2 heures avant l'examen, vous devez arrêter de consommer tout liquide.
- Pendant la prise du médicament, restez à proximité des toilettes.

Remarques importantes !

- Il est possible que vos médicaments (p. ex. comprimés pour le cœur, anticoagulants, médicaments pour le diabète ou contraceptif) soient éliminés par le lavage intestinal et n'agissent pas comme d'habitude. Parlez-en au préalable avec votre médecin.
- Si un calmant vous est administré le jour de l'examen, vous ne devez pas conduire de véhicule. Demandez à quelqu'un de venir vous chercher et demandez à votre médecin si vous avez besoin d'un accompagnateur à votre domicile.
- Veuillez lire le mode d'emploi.

Date de votre examen :

Heure :

Tampon du cabinet :



MOVIPREP®, NORGINE und das Norgine-Siegel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken. Norgine GmbH · Im Westpark 14, 35435 Wettenberg · Internet: www.norgine.de