

GB ZIVEREL® solution for oral use

INDICATION: Protective treatment of the oesophageal mucosa. Ziverel facilitates mucosal repair and relieves symptoms such as burning and pain. Ziverel is a medical device that allows rapid relief of gastro-oesophageal reflux symptoms such as pyrosis, epigastric pain, acid reflux, irritative cough and dysphonia.

The most representative form of oesophageal mucosal disorders is Gastro-oesophageal reflux disease (GERD).

GERD is characterised by certain symptoms (e.g. pyrosis, acid reflux, irritative cough and dysphonia)

that can occur together with inflammatory erosive lesions of the oesophageal mucosa.

GERD is usually exacerbated when lying down so symptoms can become worse during the night.

Ziverel is a combination of hyaluronic acid and chondroitin sulfate which together provide a mechanism that protects and helps to repair the gastro-oesophageal mucosa.

WARNINGS: Do not exceed the recommended dose. Contact your healthcare professional if symptoms persist. Do not use the product after the date of expiry shown on the packaging. Store the product in a cool, dry place away from any sources of heat. Do not freeze. Keep the product out of sight and reach of children.

The presence of a highly bioadhesive component (poloxamer 407) in the formulation of Ziverel allows the hyaluronic acid and chondroitin sulfate to stay on the surface of the oesophageal wall, thus contributing to the protective effect against the action of the hydrochloric acid and pepsin produced by the stomach.

Chondroitin sulfate also has an action that promotes the repair process of the gastro-oesophageal mucosa.

COMPOSITION/INGREDIENTS: Hyaluronic acid, sodium salt, sodium chondroitin sulfate, polyvinylpyrrolidone, xylitol, sodium benzoate, potassium sorbate, flavouring, water and poloxamer 407.

PACK: 14 or 20 stick packs of 10 ml for oral use. Not all pack sizes may be marketed.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE: Take the contents of one stick pack after each meal and at bedtime or as instructed by your healthcare professional

CONTRAINDICATIONS: There are no contraindications in particular.

In cases of hypersensitivity to any of the components, stop treatment and contact your healthcare professional. Although there are no known side effects, this product is not to be used during pregnancy or in the first months of breastfeeding. It is always advisable to check with your healthcare professional before use. There are no known interactions with other oral products.

Die häufigste Form von Störungen der Speiseröhrenschleimhaut ist die gastro-oesophageale Refluxkrankheit (GERD).

GERD ist durch Symptome wie z. B. Sodbrennen, Säurerreflux, Reizhusten und Stimmstörung gekennzeichnet, die zusammen mit entzündlichen, erosiven Läsionen der Speiseröhrenschleimhaut auftreten können.

Revision 04 dated December 2019.

UK Distributor: Norgine Pharmaceuticals Limited, Norgine House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, UB9 6NS, UK.
IE Distributor: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP Amsterdam, Netherlands.

ZIVEREL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.

GERD verschlimmert sich in der Regel im Liegen, so dass sich die Symptome in der Nacht verstärken können.

Ziverel ist eine Kombination aus Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat. Diese schaffen zusammen einen Mechanismus, der die Speiseröhrenschleimhaut schützt und zu ihrer Regeneration beiträgt.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der

Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeichen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

Eine hoch bioadhäse Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/BESTANDETEILE:

Hyaluronsäure-Natriumsalz,

Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol, Natriumbenzoat, Kaliumsorbit, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.

PACKUNG: 14 oder 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt

eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN:

DOSIS EN INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK: Neem na elke maaltijd en bij het naar bed gaan de inhoud van één stickverpakking of volg de instructies precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

CONTRA-INDICATIES: Er zijn geen bijzondere contra-indicaties. In geval van overgevoeligheid voor één van de componenten, stop met de behandeling en neem contact op met uw arts of apotheker. Hoewel er geen bekende bijwerkingen zijn, dient dit product niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste maanden van borstvoeding. Het is aan te bevelen om eerst te overleggen met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Er zijn geen gekende interacties met andere orale producten.

WAARSCHUWINGEN: De aanbevolen dosis niet overschrijden. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer de symptomen aanhouden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Bewaar het product op een koele, droge plaats weg van eventuele warmtebronnen. Niet in de vriezer bewaren. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Herziening 04 gedateerd december 2019.

Distributeur:
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, België.

Norgine B.V., Antonio Vivaldi straat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland.

ZIVEREL, NORGINE en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine bedrijvgroep.

DK ZIVEREL® oplösning, som skal synkes

INDIKATION: Beskyttende behandling af slimhindren i spiserøret. Ziverel faciliterer reparation af slimhindren og lindrer symptomer som brænlen og smerter. Ziverel er et medicinsk udstyr, som muliggør hurtig lindring af symptomer på gastroesophageal reflux, f.eks. halsbrand, epigastriske smertes, syreflukts, irritationshoste og hæshed.

SAMMENSÆTNING/ INGREDIENSER:
Hyaluronsyrenatriumsalt, natriumchondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol, natriumbenzoat, kaliumsorbit, aromastof, vand og poloxamer 407.

PAKNING: 14 eller 20 breve a 10 ml til oral anvendelse. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

DOSERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING: Tag indholdet af et brev efter hvert måltid og ved sengetid eller efter lægens anvisninger.

KONTRAINDIKATIONER: Der er ingen særlige kontraindikationer. Ved overfølsomhed over for en af ingredienserne skal du stoppe behandlingen og søge læge. Selvom

som tilsammen giver en mekanisme, der beskytter og hjælper med at reparere spiserørets slimhinde.

Tilstedeværelsen af en stærkt biologisk bindende komponent (poloxamer 407) i formuleringen af Ziverel bevirker, at hyaluronsyren og chondroitinsulfaten kan blive på overfladen af spiserørets væg og dermed bidrage til den beskyttende virkning mod saltsyren og pepsinet, som produceres i maven.

Chondroitinsulfat har også en virkning, som fremmer reparationsprocessen i spiserørets slimhinde.

SAMMENSÆTNING/ INGREDIENSER:
Hyaluronsyrenatriumsalt, natriumchondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol, natriumbenzoat, kaliumsorbit, smaknadsfors.

ZIVEREL®-liuos on tarkoitettu nieltäväksi

KÄYTÖÄIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon.

Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelua ja kipua. Ziverel on lääkinnällinen tarvike, joka tarjoaa nopean lievytyksen ruokatorven refleksitaudin oireisiin, kuten näristykseen, ylävatsans kipuihin, haponousemisseen ruokatorveen, ärsytyskään ja äänihäiriöihin.

KOOSTUMUS/AINESOSAT: Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, ksyilitoli, natriumbenzoatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloxameeri 407.

PAKKAUUS: 14 tai 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. Kaikka pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

ANNOSTUS JA KÄYTÖÖHJEET: Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen

der ikke er kendte bivirkninger, må produktet ikke anvendes under graviditet eller de første måneder af amningen. Det er altid bedst at tale med lægen før brug. Der er ingen kendte interaktioner med andre orale produkter.

ADVARSLER: Den anbefalede dosis må ikke overskrides. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. Produktet må ikke anvendes efter udlobsdatoen på pakningen. Produktet opbevares tørt og køligt og ikke i nærheden af varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Revision 04 dateret december 2019.

DISTRIBUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark.

FI ZIVEREL®-liuos on tarkoitettu nieltäväksi

KÄYTÖÄIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon.

Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelua ja kipua. Ziverel on lääkinnällinen tarvike, joka tarjoaa nopean lievytyksen ruokatorven refleksitaudin oireisiin, kuten näristykseen, ylävatsans kipuihin, haponousemisseen ruokatorveen, ärsytyskään ja äänihäiriöihin.

KOOSTUMUS/AINESOSAT: Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, ksyilitoli, natriumbenzoatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloxameeri 407.

PAKKAUUS: 14 tai 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. Kaikka pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

ANNOSTUS JA KÄYTÖÖHJEET: Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen

nousemisen ruokatorveen, ärsytyskää ja äänihäiriö, jotka voivat ilmetä yhdessä ruokatorven limakalvon erosioivisten tulehdusvauroiden kanssa.

Refluksitauti tavallisesti pahenee makuulla, joten oireet saattavat tuntua voimakkaammin oisin.

ADVARSLER: Den anbefalede dosis må ikke overskrides. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. Produktet må ikke anvendes efter udlobsdatoen på pakningen. Produktet opbevares tørt og køligt og ikke i nærheden af varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Revision 04 dateret december 2019.

DISTRIBUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark.

FI ZIVEREL®-liuos on tarkoitettu nieltäväksi

KÄYTÖÄIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon.

Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelua ja kipua. Ziverel on lääkinnällinen tarvike, joka tarjoaa nopean lievytyksen ruokatorven refleksitaudin oireisiin, kuten näristykseen, ylävatsans kipuihin, haponousemisseen ruokatorveen, ärsytyskään ja äänihäiriöihin.

KOOSTUMUS/AINESOSAT: Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, ksyilitoli, natriumbenzoatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloxameeri 407.

PAKKAUUS: 14 tai 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. Kaikka pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

ANNOSTUS JA KÄYTÖÖHJEET: Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen

ja ennen nukkumaanmenoa tai terveydenhuollon ammattilaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

VASTA-AIHEET: Erityisiä vasta-aiheita ei ole. Jos olet herkistynyt jollekin tuotteen aineosalle, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Ziverel on hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä, jotka yhdessä tarjoavatmekanismiin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen. Limakalvolle hyvin kiinnittyväni eli bioadhesiivisen ainesosan (poloksameeri 407) ansiosta Ziverel valmiste mahdollistaa hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin pysymisen ruokatorven seinämässä ja vaikuttaa osaltaan suojaavasti vatsan erittämän suolahapon ja pepsin vaikutuksia vastaan.

GERD förvärras vanligtvis när man ligger ner så symptom kan förvärras under natten.

Ziverel är en kombination av hyaluronsyra och kondroitiinisulfaat som tillsammans erbjuder en mekanism som skyddar och hjälper till att reparera slemhinnan i matstrupen.

Kondroitiinisulfaatilla on myös ruokatorven limakalvon paraneoprosessia edistävä vaikutus.

KONTRAINDIKATIONER: Det finns inga särskilda kontraindikationer. Vid överkänslighet mot någon av innehållsmärkena, stoppa behandlingen och kontakta hälso- och sjukvårdspersonal. Änä sätter lämmönlähteiden läheisyydessä. Änä pakasta. Sätter tuote poissa lasten näkyvilt ja ulottuvilla.

PAKKE: Pakke med 14 eller 20 doseposer á 10 ml for oral bruk. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

SE ZIVEREL® lösning avsedd att sväljas

INDIKATION: Skyddsbehandling

av slemhinnan i matstrupen. Ziverel underlättar slemhinnans reparation

och lindrar symptom som sveda och värk. Ziverel är en medicinteknisk produkt som ger snabb lindring av symptom på gastroesophageal reflux så som halsbränna, epigastrisk smärta, syreflux, rethosta och heshet.

FÖRPACKNING: 14 och 20 dospåsar om 10 ml för oral användning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstörrelser att marknadsföras.

NO ZIVEREL® lösning beregnet på svegning

INDIKASJON Beskyttende behandling av spiserørsslimhinnen. Ziverel understøtter reparasjon av slimhinnene og avlaster symptomer som sviing og smerte. Ziverel er et medisinsk utstyr som gir rask lindring av gastro-oesofag refluksymptomer, slik som halsbran, epigastrisk smerte, syreflukts, irritende hoste og heshet.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ikke særskilte kontraindikasjoner. Vid overkänslighet mot noen av innehållsmærkena, stopp behandlingen og kontakt helse- og sykehvitpersonen.

Ziverel er en kombinasjon av hyaluronsyra og kondroitiinisulfaat som tillsammans erbjuder en mekanism som skyddar och hjälper till att reparera slemhinnan i matstrupen.

Kondroitiinisulfaatilla on myös ruokatorven limakalvon paraneoprosessia edistävä vaikutus.

PAKKE: Pakke med 14 eller 20 doseposer á 10 ml for oral bruk. Ikke alle pakningsstörrelser er pålagt markedsført.

DOSE OG BRUKSANVISNING: Ta innholdet av én dosepose etter hvert måltid og ved sengetid, eller som føreskrevet av legen din.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ingen spesielle kontraindikasjoner. I tilfelle av overfølsomhet for noen av ingrediensene, stopp behandlingen og ta kontakt med legen din.

Selv om det ikke finnes kjente bivirkninger, skal dette produktet ikke brukes under graviditet eller i de første månedene med amming. Det er alltid tilrådelig å snakke med legen din før bruk. Det er ingen kjente interaksjoner med andre orale produkter.

ADVARSEL: Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege hvis symptomene fortsetter. Ikke bruk produktet etter utløpsdato vist på emballasjen.

Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted vekke fra varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

REVISJON 04 dateret desember 2019.

DISTRIBUTØR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark.

CE 0477

APARM s.r.l., Via Roma, 26 28041 Arona, IT